N-(乙氧酰基)-*N'*-(2,4-二硝基苯胺基)硫脲的合成、晶体结构、比热容及热力学性质

何建云^a 黄洁^{a*} 宋纪蓉^{a,b} 赵毅莎^a 马聪^a 徐抗震^a

(^a西北大学化工学院,陕西省物理无机化学重点实验室 西安 710069; ^b故宫博物院文博科技部 北京 100009)

摘要 以 PEG-400 为催化剂,利用氯甲酸乙酯和硫氰酸钾反应生成的乙氧酰基异硫氰酸酯为中间体与 2,4-二硝基苯胺反应,得到 *N*-(乙氧酰基)-*N'*-(2,4-二硝基苯胺基)硫脲,通过 IR、元素分析等方法对其结构进行了表征。在室温条件下,采用缓慢挥发法培养出适合用于 X 射线衍射测试的单晶。晶体结构数据表明,晶体属单斜系, $P2(1)/c$ 空间群,晶胞参数: $a = 4.1919(2)$ nm, $b = 12.295(6)$ nm, $c = 23.828(11)$ nm, $\alpha = \gamma = 90.00^\circ$, $\beta = 92.467(10)^\circ$, $V = 1439.7(12)$, $D_c = 1.519$ g/cm³, $\mu = 0.263$ cm⁻¹, $F(000) = 680$, $Z = 4$, $R_1 = 0.1121$, $wR_2 = 0.2540$ 。并对标题化合物进行了热重分析和比热容测定,计算了热力学函数;证明该化合物有良好的热稳定性。

关键词 合成, X 单晶衍射, 晶体结构, 比热容, 热力学性质

中图分类号: O626

文献标识码: A

文章编号: 1000-0518(2013)07-0782-07

DOI: 10.3724/SP.J.1095.2013.20401

20 世纪 60 年代末,硫脲类化合物作为杀菌剂就开始投放市场并取得良好效果^[1-3]。经过几十年的合成研究,大量的硫脲类化合物已经合成^[4-5]。由于硫脲类化合物具有良好的生物活性和特殊的配位、识别等能力,而被广泛的应用于农业杀虫剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等^[6-8];在医药方面的抗肿瘤、抗病毒或药物合成中间体等^[9-11];在工业上用于制造染料、抗蚀剂、贵金属湿法提取及离子识别等^[12-14]。

酰基胺基硫脲是一类重要的硫脲衍生物,由于其结构中既有酰基又有 3 个 N—H 键供体,具有较强的氢键键合能力,因而该类化合物在离子识别领域和农业方面有着重要的应用价值。本文在前人的研究基础上^[15],用不同方法合成出标题化合物,采用 IR 和元素分析对其结构组成进行了表征,测定了它的比热容,计算了热力学函数,并研究了热力学性质;用溶剂挥发法培养出它的单晶,用 X 射线衍射法首次测定出其晶体结构。通过结构研究和热力学性质判定,证明了标题化合物具有良好的稳定性,有利于它储存和运输。

合成路线如 Scheme 1 所示。

Scheme 1 The formation of the title compound

2012-09-12 收稿, 2012-11-22 修回

国家自然科学基金(20571060)、陕西省自然科学基金(2007B08)、陕西省农业科技攻关计划项目(S2013NY2884)资助项目

通讯联系人: 黄洁, 副教授; Tel: 029-88307755; Fax: 029-88302633; E-mail: huangjie@nwu.edu.cn; 研究方向: 新型硫脲类杀菌剂的

合成

1 实验部分

1.1 仪器和试剂

熔点用 X-4 型显微熔点测定仪(北京泰克仪器有限公司)测定。C、H、N 元素含量用 Vario ELIII 型元素分析仪(德国艾乐曼公司)测定;EQUINOX 55 型红外光谱仪(德国布鲁克公司);单晶衍射仪为 Bruker SMART CCD 型 X 射线面探测器(德国 Bruker 公司);DSC-TG 用 SDT Q600 型综合热分析仪(美国 TA 公司)测定;比热容用 Micro-DSC III 微热量仪(法国 Setaram 公司)测定。所有试剂均为市售分析纯。

1.2 标题化合物的合成及单晶的制备

干燥的条件下,在 100 mL 三口烧瓶中加入 20 mL 乙酸乙酯、13 mmol 硫氰酸钾和数滴 PEG-400,再将 12 mmol 氯甲酸乙酯在搅拌状态下,缓慢滴入上述乙酸乙酯溶液中,滴加完成后,70 ℃继续搅拌反应 3 h,趁热过滤掉生成的 KCl。将滤液转入加有 9 mmol 2,4-二硝基苯肼的三口烧瓶中,搅拌回流反应 4 h。冷却、抽滤,用蒸馏水多次洗涤后再用少量乙醇洗涤滤饼,烘干后得到黄色固体。取 20 mg 黄色固体溶于三氯甲烷-甲醇的混合溶剂中,静置 2 d 后生长出黄色透明条状晶体。

产率 84.70%, mp 221.6 ~ 223.4 ℃。FI-IR (KBr), σ/cm^{-1} : 3305.45, 3185.88 (N—H), 1739.51 (C=O), 1619.94, 1592.94, 1523.51 (phene ring), 1241.95, 1176.38 (C=S); $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}_5\text{O}_6\text{S}$ 元素分析实测值(计算值)/%: C 36.41(36.47), H 3.52(3.37), N 21.38(21.27)。

1.3 X 光衍射晶体结构测定

选取尺寸为 0.36 mm × 0.23 mm × 0.14 mm 的单晶,在 X 射线面探测器上,用石墨单色器单色化的 $\text{MoK}\alpha$ ($\lambda = 0.071073 \text{ nm}$) 射线为光源,以 ω - θ 方式扫描,在 296(2) K 温度下,扫描范围为 $1.71^\circ \leq \theta \leq 25.09^\circ$, $-5 \leq h \leq 5$, $-14 \leq k \leq 13$, $-28 \leq l \leq 25$,共收集 7078 个衍射点,其中 2550 个独立衍射点 [$R_{\text{int}} = 0.0971$]。数据经 L_p 和经验吸收校正。晶体结构由直接法解出,所有非氢原子的坐标是在以后数轮差值 Fourier 合成中陆续确定的,对全部非氢原子的坐标以及各项异性热参数用经全矩阵最小二乘法对 F^2 进行修正。结构分析用 SHELXL-97 软件^[16]完成。标题化合物的 CCDC 号为 875647。

2 结果与讨论

2.1 晶体结构分析

晶体结构分析表明,化合物的晶体为单斜晶系, $P2(1)/c$ 空间群。晶胞参数为 $a = 4.919(2) \text{ nm}$, $b = 12.295(6) \text{ nm}$, $c = 23.828(11) \text{ nm}$, $\alpha = 90.00^\circ$, $\beta = 92.467(10)^\circ$, $\gamma = 90.00^\circ$, $\mu = 0.263 \text{ mm}^{-1}$, $V = 1.4397(12) \text{ nm}^3$, $D_c = 1.519 \text{ g/cm}^3$, $F(000) = 680$, $Z = 4$,最终的偏离因子为 $R_1 = 0.1121$, $wR_2 = 0.2540$ 。最终差值电子云密度的最高峰为 0.759 e/nm^3 ,最低峰为 -0.814 e/nm^3 。

标题化合物的单晶结构数据列于表 1,部分键长、键角列于表 2,部分扭曲角列于表 3,氢键数据列于表 4,分子单晶结构见图 1,二维结构图见图 2,晶体堆积图见图 3。

表 1 标题化合物的单晶数据
Table 1 Crystal data and structure parameters of the title compound

Formula	$\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{N}_5\text{O}_6\text{S}$	Z	4
M_r	329.30	$F(000)$	680
λ/nm	0.071 073	$D_c/(\text{g}\cdot\text{cm}^{-3})$	1.519
Crystal system	Monoclinic	μ/cm^{-1}	0.263
Space group	$P2(1)/c$	$\theta \text{ range}/(^\circ)$	1.71 to 25.09
a/nm	4.919(2)	GOF	0.998
b/nm	12.295(6)	h	-5 to 5
c/nm	23.828(11)	k	-14 to 13
$\alpha/(^\circ)$	90.00	l	-28 to 25
$\beta/(^\circ)$	92.467(10)	R_1	0.112 1
$\gamma/(^\circ)$	90.00	wR_2	0.254 0
V/nm^3	1.439 7(12)		

表 2 标题化合物的部分键长 (nm) 和键角 (°)
Table 2 Selected bond lengths (nm) and bond angles (°) of the title compound

Bond length/nm					
S(1)—C(7)	0.166 3(7)	N(3)—N(4)	0.137 5(7)	C(1)—C(6)	0.140 7(10)
N(1)—O(2)	0.121 1(10)	N(4)—C(7)	0.133 2(8)	C(2)—C(3)	0.138 3(10)
N(1)—O(1)	0.123 5(10)	N(5)—C(7)	0.137 2(8)	C(3)—C(4)	0.135 5(11)
N(1)—C(3)	0.147 0(10)	N(5)—C(8)	0.138 4(8)	C(4)—C(5)	0.138 9(10)
N(2)—O(4)	0.120 6(9)	O(5)—C(8)	0.118 4(8)	C(5)—C(6)	0.141 0(9)
N(2)—O(3)	0.122 9(7)	O(6)—C(8)	0.132 3(8)	C(9)—C(10)	0.141 5(13)
N(2)—C(5)	0.146 0(10)	O(6)—C(9)	0.146 3(9)		
Bond angle/(°)					
C(6)—N(3)—N(4)	119.9(6)	C(1)—C(2)—C(3)	120.9(8)	N(3)—C(6)—C(5)	122.7(7)
C(7)—N(4)—N(3)	120.3(5)	C(4)—C(3)—C(2)	121.0(7)	C(1)—C(6)—C(5)	117.3(6)
C(7)—N(5)—C(8)	127.3(5)	C(3)—C(4)—C(5)	119.2(7)	N(4)—C(7)—N(5)	115.5(6)
C(8)—O(6)—C(9)	115.9(6)	C(4)—C(5)—C(6)	121.0(7)	O(6)—C(8)—N(5)	107.6(6)
C(2)—C(1)—C(6)	120.6(7)	N(3)—C(6)—C(1)	120.0(6)	C(10)—C(9)—O(6)	110.1(8)

表 3 标题化合物的部分扭曲角 (°) 数据
Table 3 Selected torsion angles (°) of the title compound

Bond angle/(°)			
C(6)—N(3)—N(4)—C(7)	84.4(7)	C(4)—C(5)—C(6)—C(1)	-4.1(9)
C(6)—C(1)—C(2)—C(3)	-1.1(10)	N(3)—N(4)—C(7)—N(5)	-178.0(5)
O(1)—N(1)—C(3)—C(4)	-5.9(10)	N(3)—N(4)—C(7)—S(1)	2.6(9)
O(2)—N(1)—C(3)—C(2)	-1.5(10)	C(8)—N(5)—C(7)—N(4)	-2.4(10)
C(2)—C(3)—C(4)—C(5)	-0.5(10)	C(8)—N(5)—C(7)—S(1)	177.0(6)
O(3)—N(2)—C(5)—C(4)	7.3(9)	C(7)—N(5)—C(8)—O(5)	-1.2(12)
O(4)—N(2)—C(5)—C(6)	3.2(10)	C(7)—N(5)—C(8)—O(6)	178.7(6)
N(4)—N(3)—C(6)—C(1)	8.0(9)	C(8)—O(6)—C(9)—C(10)	-174.2(9)
N(4)—N(3)—C(6)—C(5)	-174.5(5)		

表 4 标题化合物的氢键
Table 4 Hydrogen bonds of the title compound

D—H⋯A	d(D—H)/nm	d(H⋯A)/nm	d(D⋯A)/nm	∠DHA/(°)
N(3)—H(3)⋯O(4)	0.086	0.200 3	0.261 7	127.49
N(3)—H(3)⋯S(1) _{#1}	0.086	0.275 9	0.345 4	138.98
N(4)—H4B⋯O(5)	0.086	0.197 6	0.264 6	133.98
N(4)—H4B⋯O(1) _{#2}	0.086	0.227 2	0.294 2	134.86
N(5)—H(5)⋯S(1) _{#3}	0.086	0.252 2	0.336 3	165.95

Symmetry transformation; #1 $x+1, y, z$; #2 $-x+1, y-1/2, -z+1/2$; #3 $-x, -y+1, -z$.

通常,孤立的 C—O 单键与 C=O 双键键长分别为 0.143 和 0.122 nm^[2];孤立的 C—N 单键与 C=N 双键长分别为 0.1471 和 0.1273 nm^[17]。从表 2 可看出,N(4)—C(7)、N(5)—C(7)、N(5)—C(8) 和 O(5)—C(8)键长分别为 0.1332、0.1372、0.1384 和 0.1353 nm(介于单双键键长之间),表明 N(4)、C(7)、N(5)、C(8)和 O(5)原子之间形成了共轭;N(3)—C(6)键长为 0.1353 nm,其值小于 C—N 单键的键长,这是由于苯环与环外 N(3)原子形成了共轭的结果。由于 S 原子比 O 原子的推电子能力强^[18],使得连接在同一 N 原子的 2 个 C—N 键的键长不同:N(5)—C(7)的键长为 0.1372 nm,而 N(5)—C(8)的键长为 0.1384 nm。S(1)—C(7)的键长(0.1663 nm)明显比一般的碳硫双键键长(0.157 nm)要大^[18]。这是因为 S(1)与另外一个分子的 N(3)和 N(5)原子形成分子间的氢键的缘故,如图 2 所示。同时,从图 2 可以看出,N(3)—N(4)的键长(0.1375 nm)也介于 N—N 单双键(0.1449 nm,0.1252 nm)之间^[17]。

由表 3 可以看出,C(8)—N(5)—C(7)—N(4)和 C(7)—N(5)—C(8)—O(5)的扭曲角接近 0°,

表明O(5)、C(8)、N(5)、C(7)和N(4)5个原子共面。同时,苯环骨架原子的二面角:C(6)—C(1)—C(2)—C(3)、C(1)—C(2)—C(3)—C(4)、C(2)—C(3)—C(4)—C(5)和C(3)—C(4)—C(5)—C(6)均稍有偏差,但几乎接近 0° ,表明环平面稍有扭曲,但仍然具有较好的平面性。C(6)—N(3)—N(4)—C(7)的扭曲角接近 90° ,表明分子中的苯环平面与硫代脲酸乙酯支链面几乎垂直。

在标题化合物中存在2类性质的氢键:分子内氢键和分子间氢键;它们使得化合物形成复杂的空间结构,氢键数据如表4所示。第一类氢键是N(3)与O(4)、N(4)与O(5)形成的分子内氢键。第二类氢键是N(3)与S(4)、N(5)与S(5)、N(4)与O(1)形成的分子间氢键。如图2所示,在一双层中心反演对称的二聚体中,位于左侧下层一个分子上的N(5)与位于右侧上层的一个分子上的S(1)形成了分子间氢键;此时该S(1)又与位于同侧下层的另一分子上的N(3)形成了分子间氢键。同时,位于二聚体右侧上层分子上的N(5)又与左侧下层分子上的S(1)形成分子间氢键,而S(1)又与同左侧的上层分子上的N(3)形成分子间氢键。二聚体中的苯环上硝基的O(1)与相邻另一个分子的硫代脲酸乙酯支链上的N(4)形成分子间氢键;而该硝基的O(1)又与另一相邻的二聚体上的N(4)形成分子间氢键,从而形成链状结构。晶体结构中,层与层之间靠相邻2平行苯环间的 π - π 作用以及分子间氢键,形成复杂的堆积空间结构,如图3所示。

图1 标题化合物的分子结构

Fig. 1 Molecular structure of the title compound

图2 标题化合物晶体中分子排列的二维结构

Fig. 2 Two-dimensional crystal structure in the title compound

图3 标题化合物沿*a*轴方向的堆积图

Fig. 3 Packing structure along the *a* axis

图4 标题化合物的比热曲线

Fig. 4 The specific heat capacity of the title compound

2.2 化合物粉末样品的比热容测定和热力学函数计算

称取干燥的标题化合物粉末 200.5 mg,用已校正的 Micro-DSC III 微热量仪^[19]在 N_2 气氛中测定在 283 ~ 353 K 范围内的比热容,并拟合出比热容与热力学温度的函数关系式。比热容测定结果如图4所示。在所测温度范围内,比热容均随温度呈稳定的线性变化。测试样品的比热容表达式如式(1)所示。

$$C_p = -0.2475520 + 0.005972677T - 0.000004712339T^2 \quad (283\text{ K} < T < 353\text{ K})$$

(1)

在 298.15 K 时, $C_p = 366.94\text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 。

根据化合物的热容随温度变化的方程式,并根据热力学函数与热容关系式(2)~(4),可计算 283~353 K 温度区域内,化合物以标准状态 298.15 K 为基准的热力学函数焓值、熵值、吉布斯自由能值,结果列于表 5。

$$H_T - H_{298.15} = \int_{298.15}^T C_p dT$$

(2)

$$S_T - S_{298.15} = \int_{298.15}^T \frac{C_p}{T} dT$$

(3)

$$G_T - G_{298.15} = \int_{298.15}^T C_p dT - T \int_{298.15}^T \frac{C_p}{T} dT$$

(4)

表 5 标题化合物的热力学函数
Table 5 Thermodynamic functions of the title compound

<i>T</i> /K	<i>H_T</i> − <i>H</i> _{298.15} /(kJ·mol ^{−1})	<i>S_T</i> − <i>S</i> _{298.15} /(kJ·K ^{−1} ·mol ^{−1})	<i>G_T</i> − <i>G</i> _{298.15} /(kJ·mol ^{−1})
283	−5.437 8	−0.018 7	−0.141 6
288	−3.670 3	−0.012 5	−0.063 5
293	−1.875 9	−0.006 3	−0.016 3
298	−0.055 0	−0.000 2	−0.000 0
303	1.791 9	0.006 0	−0.014 5
308	3.664 4	0.012 1	−0.059 6
313	5.562 2	0.018 2	−0.135 3
318	7.484 9	0.024 3	−0.241 6
323	9.432 1	0.030 4	−0.378 3
328	11.403 4	0.036 4	−0.545 3
333	13.398 4	0.042 5	−0.742 5
338	15.416 8	0.048 5	−0.969 9
343	17.458 1	0.054 5	−1.227 3
348	19.522 0	0.060 5	−1.514 6
353	21.608 0	0.066 4	−1.831 8

2.3 化合物的 DSC-TG 分析

图 5 为标题化合物在 N₂ 气氛中升温速率为 10 °C/min 时的 DSC-TG 曲线。从图 5 可知,化合物的 DSC 曲线上有 1 个吸热峰和 2 个放热峰;吸热峰的起始温度为 216.64 °C,峰顶温度为 222.02 °C,吸热峰焓值为 224.7 J/g。从 TG 曲线可以看出,化合物为多步失重,从 204.43~232.10 °C,失重 22.72% (—COOC₂H₅ 基团占分子量的 22.19%)。通过对比分析^[20],可初步推断出第 1 个吸热阶段分解过程,如 Scheme 2 所示。

图 5 标题化合物的 DSC-TG 曲线

Fig. 5 DSC and TG curves of the title compound

Scheme 2 The decomposition route of the title compound

3 结 论

在乙酸乙酯中合成了标题化合物,采用 IR、元素分析对其结构进行了表征,测定了标题化合物的晶体结构和比热容及热分解分析。结构分析表明,化合物中存在着分子间氢键以及苯环之间弱的相互作用,使得化合物分子在空间上形成了多维网状结构。由热力学参数初步证明标题化合物具有良好的热稳定性。晶体结构及其热力学函数为后续研究提供了基础数据。

参 考 文 献

- [1] HUANG Zhishu, WU Xiaolin, LIU Yu, *et al.* The Synthesis and Biological Activity of Alkyl 4-Aryl-3-Thio-Allophanate[J]. *Chinese J Org Chem*, 1998, **18**(5):481-485 (in Chinese).
黄志舒, 吴晓琳, 刘煜, 等. 硫脲类衍生物及其生物活性研究[J]. 有机化学, 1998, **18**(5):481-485.
- [2] HUANG Jie, SONG Jirong, REN Yinghui, *et al.* Preparation, Crystal Structure and Theoretical Calculation of 4,6-Dimethoxy-2-(methoxycarbamidothiocarbamido)pyrimidine[J]. *Acta Chim Sin*, 2006, **64**(1):9-16 (in Chinese).
黄洁, 宋纪蓉, 任莹辉, 等. 4,6-二甲氧基-2-[甲氧脲基硫代脲基]嘧啶的合成、晶体结构和理论计算[J]. 化学学报, 2006, **64**(1):9-16.
- [3] SUN Xiaohong, GAO Runli, LIU Yuanfa, *et al.* Synthesis of Alkyl-4-Aryl-3-Thio-Allophanate[J]. *Chem Eng*, 2003, **31**(2):75-77 (in Chinese).
孙晓红, 高润利, 刘源发, 等. 硫脲类化合物杀菌剂的合成[J]. 化学工程, 2003, **31**(2):75-77.
- [4] SHI Qing, LI Liang. Recent Advances in Biological Activity of Acylthiourea Compounds[J]. *Guangzhou Chem Ind*, 2010, **38**(8):55-58 (in Chinese).
石青, 李良. 酰脲类化合物的生物活性研究进展[J]. 广州化工, 2010, **38**(8):55-58.
- [5] LI Yingjun, ZHANG Zhiguang, JIN Kun, *et al.* Synthesis, Characterization and Biological Activity of Acylthiourea Derivatives[J]. *Acta Chim Sin*, 2007, **65**(9):834-840 (in Chinese).
李英俊, 张治广, 靳焜, 等. 酰基硫脲衍生物的合成、结构表征及生物活性研究[J]. 化学学报, 2007, **65**(9):834-840.
- [6] LIN Qi, WEI Taibao, YAO Hong, *et al.* Studies on the Weak Interaction and Supramolecular Structure in the Crystal of *N*-Ethoxycarbonyl-*N'*-Arylthiourea[J]. *Acta Chim Sin*, 2007, **65**(2):159-164 (in Chinese).
林奇, 魏太保, 姚虹, 等. *N*-乙氧羰基-*N'*-取代芳基硫脲晶体中的弱相互作用及超分子结构研究[J]. 化学学报, 2007, **65**(2):159-164.
- [7] PENG Hao, HE Hongwu. Synthesis, Crystal Structure and Biological Activity of *N*-Substituted Benzoyl-*N'*-Substituted Arylthiourea[J]. *Chinese J Org Chem*, 2007, **27**(4):502-506 (in Chinese).
彭浩, 贺红武. *N*-取代苯甲酰基-*N'*-取代芳基硫脲的合成、晶体结构及生物活性[J]. 有机化学, 2007, **27**(4):502-506.
- [8] WANG Daxiang, BO Zaisu. New Pesticide Series[M]. Wuhan: Central China Normal University Press, 1998:31 (in Chinese).
王大翔, 柏再苏. 新农药论丛[M]. 武汉:华中师范大学出版社, 1998:31.
- [9] XIAN Liang, ZHANG Fengzhen, LIN Xin. Research of Bioactivities of Thiourea Derivatives and Their Complexes[J]. *J Northwest Univ Nat* (Nat Sci), 2010, **31**(2):7-11 (in Chinese).
鲜亮, 张峰振, 林欣. 硫脲衍生物及其配合物的生物活性研究进展[J]. 西北民族大学学报(自然科学版), 2010, **31**(2):7-11.
- [10] XUE Sijia, SHEN Jiefeng, CAI Zhijuan, *et al.* *N*-(1-Ethoxycarbonylalkyl)-*N'*- β -pyridylcarbonylthiourea[J]. *Chinese J Org Chem*, 2007, **27**(9):1137-1141 (in Chinese).
薛思佳, 申杰峰, 蔡志娟, 等. *N*-乙氧羰基取代甲基-*N'*- β -吡啶甲酰硫脲的合成及晶体结构[J]. 有机化学, 2007, **27**(9):1137-1141.
- [11] LIU Wukun, ZHOU Jinpei, ZHANG Tong, *et al.* Design and Synthesis of Thiourea Derivatives Containing a Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-*b*]pyridine Moiety as Potential Antitumor and Anti-inflammatory Agents[J]. *Bioorg Med Chem Lett*, 2012, **22**:2701-2704.
- [12] HU Jinghan, XU Weixia, WEI Taibao. Studies on the Anion Recognition of *N*-Aryl-*N'*-(4-Ethoxybenzoyl) Thioureas Derivatives by Spectroscopy[J]. *Spectrosc Spectr Anal*, 2007, **27**(6):1172-1175 (in Chinese).
胡京汉, 徐维霞, 魏太保. *N*-芳基-*N'*-(4-乙氧基苯甲酰基)硫脲衍生物阴离子识别性能的光谱研究[J]. 光谱学与光谱分析, 2007, **27**(6):1172-1175.
- [13] SHI Daqing, WANG Haiying, YANG Fang, *et al.* Synthesis of Anion Receptors Based on Aroylthiourea and Their Anion Recognition[J]. *Acta Chim Sin*, 2007, **65**(16):1713-1717 (in Chinese).

- 史达清,王海营,杨芳,等. 芳酰基硫脲受体的合成及对阴离子识别研究[J]. 化学学报,2007,**65**(16):1713-1717.
- [14] QIN Gaofei, ZHOU Ying, LUO Qin, *et al.* Process and Application of Recovering Platinum from Used Liquid-phase Catalysts by Solvent Extraction with Thiourea[J]. *Chinese J Appl Chem*, 2011, **28**(11):1337-1339 (in Chinese).
秦高飞,周莹,罗琴,等. 液相废催化剂中铂的硫脲萃取回收工艺及应用[J]. 应用化学,2011, **28**(11):1337-1339.
- [15] LIN Qi, WANG Yalin, WEI Taibao, *et al.* Studies on Synthesis of *N*-Ethoxycarbonyl-*N'*-nitrophenylamide-thioureas and Their Anion Recognition Abilities[C]//The National Symposium on the Fourteenth Macrocyclic Chemistry and the Sixth Supramolecular Chemistry. Lanzhou: Northwest Normal University, 2008:651-652 (in Chinese).
林奇,王雅琳,魏太保,等. *N*-乙氧羰基-*N'*-硝基苯基胺基硫脲的合成及其阴离子识别性能[C]//全国第十四届大环化学暨第六届超分子化学学术讨论会论文集. 兰州:西北师范大学,2008:651-652.
- [16] Sheldrick G M. SHELXS-97; Program for Crystal Structure Re-finement, Göttingen University, Göttingen, 1997.
- [17] SONG Jirong, REN Yinghui, HUANG Jie, *et al.* Synthesis, Crystal Structure and Theoretical Calculation of 4-(1,2,4-Triazole-5-one-4-yl)-3-thiourea Carboxylic Acid Ethyl Ester[J]. *Acta Chim Sin*, 2006, **64**(13):1334-1340 (in Chinese).
宋纪蓉,任莹辉,黄洁,等. 4-(1,2,4-三唑-5-酮-4-基)-3-硫代脲酸乙酯的合成、晶体结构及理论计算[J]. 化学学报,2006, **64**(13):1334-1340.
- [18] Zhao D, Huang J, Song J R, *et al.* Synthesis, Crystal Structure and Thermal Analysis of *N*-(2,3-Dimethyl-phenyl)-*N'*-(methoxyl formyl)thiourea[J]. *Chem Res Chinese Univ*, 2012, **28**(2):230-233.
- [19] ZHANG Xinyu, ZHANG Pengjuan, SONG Jirong, *et al.* Synthesis, Crystal Structure, Theoretical Calculation, Specific Heat Capacity and Thermodynamic Properties of 4-[(3-Ethoxyacyl-2-thio) thiourea]-4'-[(3-ethoxyacyl-2-thio) thiourea] diphenyloxide[J]. *Acta Chim Sin*, 2010, **68**(17):1692-1698 (in Chinese).
张新瑜,张鹏娟,宋纪蓉,等. 4-[(3-乙氧酰基-2-硫代)硫脲]-4'-[(3-乙氧酰基-2-硫代)硫脲]二苯醚配体的制备、晶体结构、量化计算、比热容、热力学性质研究[J]. 化学学报,2010, **68**(17):1692-1698.
- [20] Zhang X Y, Huang J, Song J R, *et al.* Synthesis, Crystal Structure, Theoretical Calculation, Specific Heat Capacity, and Thermodynamic 4,4'-Bis(3-*N*-methoxyformyl thioureido)-diphenyloxide[J]. *Chinese J Chem*, 2010, **28**:1897-1901.

Synthesis, Crystal Structure, Specific Heat Capacity and Thermodynamic Properties of *N*-(Ethoxycarbonyl acyl)-*N'*-(2,4-dinitrophenyl amino) Thiourea

HE Jianyun^a, HUANG Jie^{a*}, SONG Jirong^{a,b}, ZHAO Yisha^a, MA Cong^a, XU Kangzhen^a

(^aDepartment of Chemical Engineering/Shaanxi Key Laboratory of Physico-Inorganic Chemistry, Northwest University, Xi'an 710069, China;

^bConservation Technology Department, the Palace Museum, Beijing 100009, China)

Abstract *N*-(Ethoxycarbonyl acyl)-*N'*-(2,4-dinitrophenyl amino) thiourea was synthesized using 2,4-dinitrophenylhydrazine, potassium thiocyanate and ethyl chloroformate as precursors in ethyl acetate in the presence of Macrogol-400 catalyst. The structure was characterized by elemental analysis and FI-IR. Single crystal of the title compound was obtained by slowly evaporating solvents at the room temperature. The crystal structure was determined with single crystal X-ray diffractometer. Crystal data are: monoclinic, P2(1)/c space group, $a = 4.1919(2)$ nm, $b = 12.295(6)$ nm, $c = 23.828(11)$ nm, $\alpha = \gamma = 90.00^\circ$, $\beta = 92.467(10)^\circ$, $V = 1439.7(12)$, $D_c = 1.519$ g/cm³, $\mu = 0.263$ cm⁻¹, $F(000) = 680$, $Z = 4$, $R_1 = 0.1121$, $wR_2 = 0.2540$. The thermal behavior of the title compound was studied under a non-isothermal condition by DSC method. The specific heat capacity of the title compound was determined with continuous C_p mode of microcalorimeter. The structure analysis and thermodynamic properties proved that the title compound has good stability, which is good for transportation and storage.

Keywords synthesis, X-ray diffraction, crystal structure, specific heat capacity, thermodynamic properties